


Diagnostic




Lieu noir de mer de Barents et de mer de Norvège

Mise à jour :
2021


Mortalité par pêche



Stock de géniteurs




Recrutement



Diagnostic

Stock-Recrutement



2021

lieunarc

Diagnostic : La mortalité par pêche a beaucoup baissé depuis 2012 et la biomasse de géniteurs beaucoup augmenté depuis 2011.

Les rejets sont considérés négligeables.

	Statut	B/B_{pa}	F/F_{pa}	F/F_{msy}	F/F_{plan}	$B/MSY-B_{trigger}$
2019	En bon état	2.40	0.71	?Ref ?		?Ref ?
2020	En bon état	2.53	0.66	?Ref ?		?Ref ?
2021	En bon état	2.59	0.63	?Ref ?		?Ref ?

Evolution du stock selon l'évaluation réalisée en 2021

Les points de référence RMD (F_{msy} , $B_{trigger}$) ne sont pas définis. Par rapport aux points de précaution (F_{pa} , B_{pa}), les indicateurs sont au vert : le stock est largement dans ses limites de sécurité et donc considéré en bon état.

Avis : Le CIEM recommande que, dans le cadre de l'approche RMD, la mortalité par pêche en 2022 soit fixée au niveau de la mortalité par pêche retenue comme objectif dans le plan de gestion en place ($F_{plan}=F_{msy}$), soit des captures, au plus, de 197 212 tonnes, soit un avis identique à celui de l'an dernier. Par ailleurs, le CIEM recommande que les captures accessoires de morue côtière et de grand sébaste soient limitées au maximum.