

Diagnostic




Palourde du golfe du Morbihan

2011

Pêcherie des eaux littorales

Principaux métiers : pêche en apnée, pêche à pied et drague à palourde

La France est le seul exploitant



(source Ifremer/CLPMEMAY-VA, 2011)

Les indicateurs de densités moyennes sont stables voire en augmentation depuis 2005. La taille moyenne des palourdes commerciales présentes sur le gisement se sont accrues régulièrement de 2004 à 2009 et amorcent un léger fléchissement en 2010. Les campagnes d'évaluation ont permis de déceler deux années consécutives (2005 et 2006) de forts recrutements (effectifs de palourdes inférieures à 17 mm) suivies de quatre années de faibles recrutements (2007 à 2010).

Les rendements ont été multipliés par deux entre 2003 et 2007, conséquence des deux bons recrutements 2005 et 2006 et des mesures de gestions restrictives mises en place depuis 2004. Ils ont diminué lors des deux dernières campagnes de pêche. En effet, les recrutements récents sont faibles et l'exploitation porte toujours sur les recrutements 2005 et 2006 dont les cohortes s'amenuisent.

Ce stock avait connu une régression sensible après les premières années d'exploitation intensive (1995-2001). Après une nette amélioration entre 2004 et 2008 le stock est stabilisé en 2009 et 2010 grâce aux mesures de gestion très restrictives mises en place ses dernières années. Cependant, la situation reste fragile car très dépendante des variations du recrutement.

B_{2010}/B_{pa}	Tendance B	F_{2009}/F_{pa}	Tendance F	F_{2009}/F_{msy}	F_{2009}/F_{plan}
?Ref?		?F?Ref?		?	sans objet

Augmenter le reliquat du stock de palourdes restant en place après la saison de pêche (en augmentant la taille de capture et/ou en diminuant la pression de pêche globale) permettrait de pallier plusieurs années consécutives de faibles recrutements et d'assurer une meilleure durabilité de l'exploitation.

NB. L'impact de la pêche de loisir est très faible sur ce gisement de palourde.