




Diagnostic




Vivaneau de Guyane

2011

Pêcherie du plateau continental
Principal métier : lignes (quelques casiers)
75% des captures sont débarquées en Guyane par des navires vénézuéliens



Diagnostic



La mortalité par pêche semble se stabiliser depuis 2004 à un niveau élevé. Le stock de géniteur est en augmentation et le recrutement se maintient à son plus haut niveau historique.

E_{2011}/E_{pa}	Tendance B	F_{2010}/F_{pa}	Tendance F	F_{2010}/F_{msy}	F_{2010}/F_{plan}
?Ref?	↗	?Ref?	→	?Ref?	sans objet

En l'absence de points de référence, il n'est pas possible de qualifier ce stock (précaution et RMD).

Cependant, bien que l'effort de pêche reste à un niveau élevé, l'augmentation constante depuis 2002 du stock de géniteur associée aux forts recrutements estimés laissent à penser que le stock en vivaneaux s'améliore.

Il reste cependant certaines lacunes à combler pour compléter cette évaluation comme la non prise en compte des captures de vivaneaux effectuées par les caseyeurs. Il est également indispensable de considérer les captures accessoires de vivaneaux notamment sur les juvéniles de la pêcherie chalutière crevettière, dont on sait qu'elles ont pu, dans le passé, être très importantes.