



Marlin bleu de l'Atlantique

2011

Pêcherie pélagique
Principal métier : pêche artisanale sous DCP

En 2005 (seule année de déclaration officielle de la France), les captures déclarées de marlin bleu des Antilles françaises étaient les plus importantes de toutes les parties contractantes de la CICTA, près du quart des captures totales de l'Atlantique et 50% des captures totales de l'Atlantique Nord.

B2004/BPME	F2004/FPME
<1	>1 ?

(source CICTA 2006-2007)

Le diagnostic est peu précis mais indique une quantité de reproducteurs très probablement inférieure à BPME, et un taux de prélèvement récent vraisemblablement supérieur à FPME.

Depuis l'évaluation de 2006 (Anon. 2007a), aucune nouvelle information sur l'état du stock n'a été fournie. Le récent niveau de biomasse reste très vraisemblablement bien en dessous de BPME estimée en 2000. Les diagnostics actuels et provisoires suggèrent que F a diminué entre 2000 et 2004 et était probablement supérieure à FPME estimée lors de l'évaluation de 2000. Au cours de la période 2001-2005, plusieurs indicateurs de l'abondance donnent à penser que le déclin s'est, en partie, arrêté mais d'autres indicateurs suggèrent que l'abondance a continué à décliner.

NB. Quatre ou cinq années de données supplémentaires, au moins, seront requises pour confirmer ces récents changements apparents de la tendance, compte tenu notamment du fait que la fiabilité des récentes informations a diminué et pourrait continuer à le faire.