



Chinchard commun (*Trachurus trachurus*)

Répartition géographique


Il existe deux espèces de chinchard en Atlantique Est : le chinchard commun et le chinchard à queue jaune (*Trachurus mediterraneus*). Le premier vit des côtes norvégiennes jusqu'en Afrique du Sud en passant par la Méditerranée, la mer Noire et la mer de Marmara. Le second a une aire de répartition plus limitée : du golfe de Gascogne aux côtes méditerranéennes.

Habitat

Les deux espèces sont pélagiques grégaires. Le chinchard commun fréquente tout le plateau continental et le bord du talus de 10 à 500 mètres de profondeur. Il effectue des mouvements de migration saisonniers vers la côte en été, suivis de retours vers le large en automne. Le chinchard à queue jaune, lui, est plus côtier et aime les eaux moins salées des estuaires.


Reproduction

Le chinchard commun acquiert sa maturité lorsqu'il a atteint une taille de 20 à 22 cm qui correspond à un âge de trois ans. La maturité est plus tardive chez la femelle (4 – 5 ans). La ponte a lieu de mars à août dans le golfe de Gascogne et en mer Celtique, elle serait plus précoce plus au sud. La femelle porterait entre 3000 et 14000 ovules. L'éclosion des œufs a lieu après 3 jours d'incubation à une température de 16° environ. Les œufs émis sont particulièrement denses en Manche et en mer du Nord.



Croissance

La larve pélagique mesure 2,5 cm. La croissance du chinchard est rapide la première année. L'espèce aurait une longévité de 15 ans environ.



Alimentation

Le chinchard, aux stades larvaire et juvénile, se nourrit essentiellement de copépodes. Une fois adulte, il mange poissons, céphalopodes et crustacés.