

Exploitation




Germon (Thunnus alalunga)

Le stock du Nord est exploité par les pêcheries de surface ciblant principalement des poissons immatures et pré-adultes (50 à 90 cm) et par les pêcheries palangrières ciblant les germons immatures et adultes (60 à 130 cm).

Les principales pêcheries de surface comprennent les flottilles communautaires (CE-Espagne, CE-France, CE-Portugal et CE-Irlande) opérant, en été et en automne, dans le Golfe de Gascogne, dans les eaux adjacentes de l'Atlantique Nord-Est, et à proximité des îles Canaries et des Açores. Le Taïpei chinois opère, tout au long de l'année, la principale flottille palangrière au centre et à l'ouest de l'Atlantique Nord. Toutefois, l'effort de pêche du Taïpei chinois a diminué à la fin des années 1980, en raison d'un changement de ciblage au profit des thonidés tropicaux, et s'est ensuite maintenu à ce faible niveau jusqu'à présent.


Au cours des ans, la contribution relative des différentes flottilles ciblant le germon de l'Atlantique Nord a évolué, causant des effets différentiels sur la structure démographique du stock. En 2008, les prises totales se sont élevées à 20.359 t, ce qui représente une baisse par rapport à la production de 2007 et au chiffre record de 2006 (36.989 t) ; c'est aussi le chiffre le plus bas jamais enregistré au cours des décennies passées. Les pêcheries de surface représentaient la majorité de la prise totale avec 17.861 t déclarées en 2008 (88%).

Les prises déclarées à la Commission Européenne par la France en 2007 était de 3.009 t. Les pics de captures de 2005 et 2006 s'expliquent par un report de l'effort de pêche des chalutiers pélagiques qui ciblent normalement l'anchois (décision de fermeture de cette pêche en 2005). Cependant la tendance des captures française dans le Golfe de Gascogne est plutôt à la baisse.




Tendance du poids moyen pour les pêcheries de surface et de palangre dans les stocks de l'Atlantique Nord et Sud. (source CICTA 2008-2009)

Ces courbes illustrent la tendance du poids individuel moyen des captures pour toutes les flottilles de surface (canniers et autres flottilles de surface) pour la période 1975-2005. A partir de 1981, une tendance stable est identifiée avec une moyenne de 13,4 kg et un poids maximum et minimum de 17,6 kg et 11 kg, respectivement, alors que la tendance du poids moyen pour les pêcheries palangrières affichait une augmentation après 1996



Débarquement de germon selon l'engin (source CICTA 2008-2009 (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique. The International Commission for the Conservation of Atlantic's Tunas)



Captures selon métier dans le Golfe de Gascogne pour les navires français (source DPMA - Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture - 2009)

En 2008, les prises déclarées à la CE par l'Espagne se sont élevées à 12.750 t (ligne traînante et canne) en été (pêcherie de la Mer de Cantabrie et pêcherie des canneurs des îles Canaries). Elles représentent une diminution de 13% par rapport aux prises déclarées en 2007.

En revanche, les prises de l'Irlande ont augmenté de deux fois et demie par rapport à 2007. Les taux de capture standardisés des poissons âgés de 1 à 3 ans de la flottille de ligneurs espagnols ont été actualisés en 2008 ; ils affichaient une tendance à la hausse depuis 2003, atteignant les chiffres les plus élevés en 2005 et 2006 pour l'âge 1 et l'âge 2, puis diminuaient en 2007 pour augmenter en 2008. L'âge 3 dégageait une tendance à la hausse continue de 2003 à 2008. Les taux de capture de la flottille irlandaise de chalut semi-pélagique indiquait une forte réduction en 2007 par rapport aux estimations plus élevées pour 2005 et 2006.

La capture de la pêcherie de canneurs de CE-Portugal s'est élevée à 614 t en 2008, soit une augmentation du triple de la valeur de 2007.